



Denk aan het milieu. Denk na voor je print!

Tropische wouden verdwijnen tegen snel tempo

Redactie

4/09/14 - 17u03 Bron: Belga



© thinkstock.

Door de aanleg van wegen, houtkap en bosbouw verdwijnen steeds meer oorspronkelijke wouden. Vooral de tropische en de naaldwouden in de noordelijke gebieden worden daardoor getroffen. Dat blijkt uit een rapport.

De laatste onaangetaste boslandschappen verdwijnen volgens een onderzoek tegen een snel tempo. In de periode van 2000 tot 2013 is hun omvang met 8,1 procent afgenomen. Dat staat in een vandaag gepubliceerd, gezamenlijk rapport van Greenpeace, de University of Maryland en het World Resources Institute (WRI). Het verlies komt overeen met een oppervlakte van 34 keer de grootte van België (104 miljoen hectare). Bijzonder getroffen zijn de tropische oerwouden en de boreale naaldwouden van Canada, Rusland en Alaska.

Het onderzoek is volgens Greenpeace gesteund op publieke satellietbeelden en eigen kaarten. "De boslandschappen vormen de biotoop van ontelbare dier- en plantensoorten, reguleren het klimaat, reinigen lucht en water en betekenen de bestaansbasis van vele volkeren", zei de woudexpert van Greenpeace, Jannes Stoppel.

Maar de mens laat zijn sporen achter in de wildernis. "Nieuwe wegen en bosgangen doorsnijden en fragmenteren de intacte woudarealen. En dat effent het pad voor nog meer illegale en commerciële houtkamp en andere verwoestende ontwikkelingen", zei Stoppel. "Het is eigenlijk ongelooflijk tegen welke snelheid we onze natuurlijke levensbeginselen vernietigen". Bij het rapport ging het er daarom om een globale blik te krijgen hoe de mens intacte boslandschappen verwoest.

Bossen en wouden bedekken meer dan een kwart van de wereldwijde landoppervlakte. Maar nog slechts een twaalfde van het landoppervlak bestaat nog uit onaangetaste wildernis, de meeste daarvan zijn wilde bossen, maar ook meren, struikgewassen, graslanden, moerassen en rotsen. Bijna 95 procent van de overblijvende wildernis bevindt zich volgens het rapport in tropische en boreale gebieden. Daar is de teloorgang sinds 2000 bijzonder hoog. Zevenenveertig procent van de ecologische ontwaarding van onbeschadigde arealen vindt in de boreale woudgordel plaats. Vijfentwintig procent verdween in het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied, nog eens negen procent in het Afrikaanse Congobekken.

De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.